

2026年度 埼玉医科大学短期大学  
専攻科(母子看護学専攻)一般選抜／社会人選抜  
学 力 試 験 (専門基礎分野・専門分野)

|              |    |
|--------------|----|
| 問題用紙         | 5枚 |
| 解答用紙(マークシート) | 1枚 |

〈 記入上の注意 〉

問題は30問あります。解答欄は1～30までを使用してください。

無断転載・複製を禁ず

## 学力試験

1 以下の問いに答えなさい。

＜1＞ファロー四徴症の特徴はどれか。

1. 動脈管開存
2. 左室肥大
3. 肺動脈拡大
4. 大動脈騎乗

＜2＞日本人の食事摂取基準（2025 年版）におけるエネルギー産生栄養素バランスで 18～29 歳の女性の目標量とされる範囲で正しいのはどれか。

1. たんぱく質 50%
2. 脂 質 20～30%
3. 炭水化物 30～40%
4. 飽和脂肪酸 9%以上

＜3＞医療保険制度の種類で地域保険はどれか。

1. 船員保険
2. 共済組合
3. 国民健康保険
4. 後期高齢者医療制度

＜4＞わが国の母子保健施策に関する法律で公布年が最も古いのはどれか。

1. 児童虐待防止法
2. 成育基本法
3. 子ども家庭庁設置法
4. 子ども基本法

＜5＞脳脊髄液検査のため腰椎穿刺を行う患者の対応で適切なのはどれか。

1. 飲食は、実施 8 時間前から禁止する。
2. 穿刺時は、背筋をのばした側臥位とする。
3. 穿刺中は、下肢のしびれに注意する。
4. 検査後は、頭部を高くして安静を保つ。

＜6＞左上肢に輸液ラインが入っている患者の寝衣交換で正しいのはどれか。

1. 左上肢を健側として扱う。
2. 脱衣は左上肢から行う。
3. 輸液ボトルは、刺入部より下にしない。
4. 輸液ボトルは、着衣した後に袖口に通す。

＜7＞大動脈弁狭窄症について正しいのはどれか。

1. 男性より女性が多い。
2. 症状のない時期が長い。
3. 右室肥大をきたす。
4. 狭心症を合併するのはまれである。

＜8＞輸血後の副作用で誤っているのはどれか。

1. 肺水腫を伴う急性の呼吸器障害がおこる。
2. スクリーニング検査をしているので輸血後感染はおこらない。
3. 化学療法中に繰り返し輸血を行うと血小板が破壊される。
4. 輸血後 10 日前後より移植片対宿主病が出現する。

＜9＞胃食道逆流症の臨床分類として食道粘膜の傷害の大きさと分布を組み合わせる重症度を評価する。この分類を何というか。

1. ロサンゼルス分類
2. ゴリガー分類
3. クイノー分類
4. チャイルド-ビュー分類

＜10＞妊娠糖尿病（GDM）の診断基準はどれか。

1. 空腹時血糖値 $\geq 126$  mg/dL
2. HbA1c 値 $\geq 5.8$  %
3. 75g OGTT の 1 時間値 $\geq 190$  mg/dL
4. 75g OGTT の 2 時間値 $\geq 153$  mg/dL

＜11＞頭蓋内圧亢進症状で誤っているのはどれか。

1. 血圧上昇
2. 頻脈
3. 瞳孔不同
4. うっ血乳頭

＜12＞高度出血によるショックで乏尿をきたした患者の腎機能不全はどれか。

1. 腎前性急性腎不全
2. 急性細尿管壊死
3. 急性間質性腎炎
4. 腎後性急性腎不全

＜13＞婦人科で使用される腔錠と適応症の組み合わせで正しいのはどれか。

- |             |       |             |
|-------------|-------|-------------|
| 1. 腔トリコモナス症 | ----- | エストリオール     |
| 2. 腔カンジダ症   | ----- | メトロニダゾール    |
| 3. 萎縮性膣炎    | ----- | オキシコナゾール硝酸塩 |
| 4. 細菌性膣症    | ----- | クロラムフェニコール  |

＜14＞変形性膝関節症患者の生活指導で適切なのはどれか。

1. 床拭きの際は、膝をついて移動する。
2. 排泄の際は、和式トイレを勧める。
3. 畳に座る際は、正座より横座りが良い。
4. 杖を使用する際は、健側にもって歩行する。

＜15＞シェーグレン症候群患者のケアで適切なのはどれか。

1. 耳下腺のマッサージをする。
2. 防腐剤入りの点眼薬にする。
3. アイメイクは禁止する。
4. 長時間の読書避ける。

＜16＞加齢に伴う薬物動態の変化で正しいのはどれか。

1. 水溶性薬物の血中濃度は上昇する。
2. 脂溶性薬物の血中濃度は上昇する。
3. 初回通過効果を大きく受ける薬物は血中濃度が低下する。
4. 腎排泄型の薬物の血中濃度は低下する。

＜17＞子どもが音を聴いたときの反応でないのはどれか。

1. 驚愕反射
2. 眼瞼反射
3. 後弓反張
4. モロー反射

＜18＞令和 6 年度（2024 年度）の男女共同参画白書における性犯罪・性暴力で正しいのはどれか。

1. ワンストップ支援センターへの相談件数は、年々減少している。
2. 不同意性交等の加害者は、被害者の知らない人が多い。
3. 不同意性交等の被害女性の 20%は誰にも相談していない。
4. 児童ポルノ事犯の検挙件数は前年に比べ減少している。

＜19＞妊娠 31 週の初産婦、規則的な下腹部痛と出血があり外来受診した。内診の結果、未破水、子宮頸管の短縮と子宮口の開大が認められ、早産の危険性があるため緊急入院となった。胎児心拍は良好。治療薬で使用しないのはどれか。

1. ベタメタゾン
2. ジノプロスト
3. リトドリン塩酸塩
4. 硫酸マグネシウム水和物

＜20＞出生体重 3,200 g の正期産児の経過で正常なのはどれか。

1. 出生後 2 時間の血糖値が 30mg/dL である。
2. 生後 22 時間にレンガ色の尿が観察された。
3. 生後 24 時間以内の総ビリルビン値が 1 日  $\geq 14$  mg/dL である。
4. 生後 4 日目の体重が 2,850 g である。

**2** 胎盤剥離徴候と胎盤の娩出について

正しいものには (1)、誤っているものには (2) をマークしなさい。

〈21〉 シュレーダー徴候では、陰門付近で臍帯を止めたコッヘル鉗子が10cm以上下降する。

〈22〉 シュルツ様式の胎盤娩出は、胎盤の中央から剥離が始まり胎児面から胎盤が娩出される。

〈23〉 ストラスマン徴候では、胎盤が剥離している場合は恥骨結合上部を圧迫すると臍帯が外陰部へ押し出される。

〈24〉 嵌頓胎盤とは、子宮壁から剥離した胎盤が子宮峡部の異常収縮により娩出されない状況をいう。

〈25〉 アールフェルド徴候では、子宮底は上昇し子宮は細長く右に傾く。

**3** 産褥期の経過について

正しいものには (1)、誤っているものには (2) をマークしなさい。

〈26〉 乳頭・乳輪への刺激は、下垂体前葉からオキシトシンの分泌を促す。

〈27〉 子宮は、産後4～6週で非妊時の大きさに回復する。

〈28〉 マタニティブルーズは、産後1週をピークとして2～3か月続く。

〈29〉 骨盤底のトレーニングは、産後1日目から行える。

〈30〉 産後2～3日排便の見られない場合は、腹部の温罨法を行う。